

Instructies toediening Rotarixvaccin



UMC Utrecht
Julius Centrum

Beste ouders/verzorgers,

U heeft vanuit het ziekenhuis waar uw zoon of dochter onder behandeling is een tweede dosis Rotarixvaccin mee naar huis gekregen om zelf aan uw kind toe te dienen. In dit formulier staat belangrijke informatie over hoe u het vaccin moet bewaren en toedienen.



RIVAR

Bewaren

Het Rotarixvaccin dient gekoeld bewaard te worden bij een temperatuur tussen de 2 en 8 graden Celsius. Voor het vervoer van het vaccin vanuit het ziekenhuis heeft u een koelelement meegekregen. Plaats het vaccin na thuiskomst zo snel mogelijk in de koelkast en bewaar het daar tot het moment dat u het vaccin aan uw kind gaat toedienen.

Toedienen

Bij voorkeur dient u de tweede Rotarixdosis toe wanneer uw kind ongeveer 4 maanden oud is. Wij adviseren u om het Rotarixvaccin toe te dienen op de dag dat uw kind de tweede of derde vaccinaties ontvangt op het consultatiebureau. Het kan op dezelfde dag worden gegeven als het hexavalentvaccin (vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Haemophilus influenzae B en hepatitis B) en het vaccin tegen pneumokokken. Welk moment u ook kiest, het is belangrijk dat de tweede dosis Rotarixvaccin wordt toegediend minimaal 4 weken na de eerste dosis en niet later dan 26 weken na de geboorte.

Het Rotarixvaccin wordt in de mond toegediend. U dient het vaccin op de volgende wijze toe:

1. Verwijder het beschermdopje van de applicator voor **orale** toediening.

2. Dit vaccin **alleen oraal toedienen**. Het kind kan het beste in een zitpositie licht achterover gehouden worden. Dien de hele inhoud van de applicator voor **orale toediening oraal** toe (in de mond van het kind, op de binnenkant van de wang).

3. Niet injecteren.

Het vaccin is klaar voor gebruik. Het vaccin moet worden toegediend zonder het te mengen met andere oplossingen of vloeistoffen.



Wanneer u het vaccin hebt toegediend noteert u dit op de RIVAR-vaccinatiekaart. Deze kaart heeft u meegekregen uit het ziekenhuis op het moment dat de eerste dosis Rotarix werd toegediend aan uw kind. Op de Rotarixapplicator zit een sticker met het lotnummer/batchnummer van het vaccin. Neem deze sticker van de applicator en plak hem op de RIVAR-vaccinatiekaart in het vakje voor de tweede dosis. Bewaar de RIVAR-vaccinatiekaart bij het Blauwe Groeiboek van uw kind.

Aandachtspunten

Wanneer uw kind het grootste deel van het vaccin uitspuugt, neemt u dan contact op met de behandelend (kinder)arts van uw kind. Mogelijk is het nodig om een vervangende dosis vaccin toe te dienen.

Uw kind mag gewoon gevoed worden vóór of na toediening van het vaccin. Borstvoeding heeft geen effect op de werkzaamheid van het vaccin.

Melden van bijwerkingen

Bij vermoeden op een bijwerking, meldt u dit dan bij het LAREB. Dit kan via: <https://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx> Vermeld hierbij steeds dat het gaat om rotavirusvaccinatie in het kader van het RIVAR-project.

Het vermoeden op een bijwerking dient ook gemeld te worden aan het RIVAR-projectteam via: rivar@umcutrecht.nl of telefoon: 06 5012 4901.